

AirAllergy

Réseau de Surveillance Aérobiologique Belge



Feuillet d'information hebdomadaire

Semaine 14 : du 4 au 10 avril 2022

Pollen actuellement dans l'air :



Betula spp. (Bouleau)



Fraxinus excelsior (Frêne)

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID



Résultats hebdomadaires des comptages sporo-polliniques

Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour

Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

04-10/04/2022	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Erable)	4	1	1	0	3
Alnus spp. (Aulne)	2	3	13	1	4
Betula spp. (Bouleau)	301	384	1908	5	264
Carpinus betulus (Charme)	2	1	1	0	8
Corylus avellana (Noisetier)	1	4	10	0	0
Ericaceae (Ericacées)	1	0	0	0	0
Fraxinus excelsior (Frêne)	57	50	58	20	101
Hippophae rhamnoides (Argousier)	0	0	0	72	0
Juncaceae (Juncacées)	0	0	2	0	2
Larix spp. (Mélèze)	0	0	6	0	0
Ligustrum vulgare (Troène)	13	0	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	7	3	5	0	8
Platanus spp. (Platane)	13	5	2	0	1
Poaceae (Graminées)	2	0	0	0	0
Populus spp. (Peuplier)	17	58	14	1	0
Quercus spp. (Chêne)	3	4	0	0	1
Salix spp. (Saule)	88	162	79	6	25
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	30	126	46	1	21
Ulmus spp. (Orme)	1	1	2	0	1
Urticaceae (Urticacées)	0	0	0	0	1
Total	542	802	2147	106	440

Résultats hebdomadaires des comptages sporo-polliniques

Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour

Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)



04-10/04/2022	Bruxelles	Genk
Alternaria spp.	15	5
Botrytis spp.	15	15
Cladosporium spp.	1070	1420
Epicoccum spp.	0	5
Stemphylium spp	0	0
Total	1175	1445

Commentaire sur l'évolution de la saison



Suite aux conditions météorologiques plus fraîches et plus humides, le risque pour les personnes qui souffrent d'une allergie au pollen de bouleau a significativement diminué la semaine passée. Les concentrations ont oscillé au plus proche du seuil critique symptomatique (80 grains/m³) à Bruxelles, Baudour et Marche-en-Famenne. à l'exception. C'est à Genk que les concentrations ont été les plus élevées (avec un pic de 773 grains/m³ le 7 avril), largement au-dessus du seuil critique. Tandis qu'à la côte, les taux mesurés ont été quasiment nuls.

Les personnes allergiques à ce type de pollen doivent maintenir toutes leurs précautions en cette période.



Graphiques des concentrations des principaux pollens et spores fongiques allergisants présents dans l'air à Bruxelles



Graphiques des concentrations des principaux pollens et spores fongiques allergisants présents dans l'air à Bruxelles



Graphiques des concentrations des principaux pollens et spores fongiques allergisants présents dans l'air à Bruxelles



Graphiques des concentrations des principaux pollens et spores fongiques allergisants présents dans l'air à Bruxelles

